



Inventaire naturaliste : Biot Au Jardin

Liste des espèces recensées

Le tableau ci-dessous reprend la liste des espèces contactées lors de l'inventaire du **samedi 12 décembre 2020**. L'ensemble des données est disponible sur la base de données collaborative www.faune-paca.org.

28 données d'oiseaux ont été collectées, représentant un total de **13 espèces différentes**.



Fauvette mélanocéphale © Aurélien Audevard

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Nombre
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	4
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	3
Fauvette mélanocéphale	<i>Sylvia melanocephala</i>	3
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>	2
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	1
Perruche à collier	<i>Psittacula krameri</i>	1
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	1
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	2
Pigeon biset domestique	<i>Columba livia f. domestica</i>	1
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	1
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	2
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	4
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	3



Mésange bleue © André Simon



Rougegorge familier © André Simon



Mésange charbonnière © André Simon



Le Pouillot véloce – *Phylloscopus collybita*

Les pouillots sont des petits passereaux de taille relativement réduite et présentent un plumage assez uni et terne. Pour un œil non averti, ils peuvent facilement être confondus. L'identification du Pouillot véloce nécessite l'observation attentive de son plumage brun olive, de son sourcil crème, et d'une suffusion jaune sur la face et sous les ailes. Il se reconnaît facilement à son chant, une alternance rythmée de « tchip tchap tchip tchap... » qui lui a valu ses noms anglais ('chiffchaff') et allemand ('zilpzalp').

Si la plupart de nos Pouillots véloces partent hiverner en Afrique ou dans la péninsule ibérique, certains restent sous les climats océaniques européens durant la mauvaise saison. Sa population montre un déclin régulier et significatif depuis les années 90 avec un recul de 20 % des effectifs.



Pouillot véloce © Aurélien Audevard



La Fauvette à tête noire - *Sylvia atricapilla*

Reconnaissable à son béret caractéristique, noir chez le mâle, marron chez la femelle et les jeunes, la Fauvette à tête noire est la plus commune des fauvettes des milieux arbustifs.

Les insectes et leurs larves, les araignées sont les proies principales de son régime alimentaire durant la belle saison, alors que les fruits comme les pommes, les mûres, les raisins, les figues, les olives ou les baies de lierre complètent son alimentation à l'automne et en hiver.

La fauvette à tête noire vit de l'ouest de l'Europe jusque dans le sud-ouest de la Sibérie, en passant par le nord de l'Iran, l'Afrique du Nord, les îles de l'Atlantique jusqu'aux Açores. Les populations d'Europe centrale hivernent dans les îles britanniques et sur les côtes atlantiques françaises alors que les oiseaux nordiques passent la mauvaise saison au Sahel.



Fauvette à tête noire © Aurélien Audevard